

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ



> Бр Дж Клин Фармакол. 2003 г., июнь; 55 (6): 591-5. doi: 10.1046/j.0306-5251.2002.01770.x.

Комбинированное применение СИОЗС и НПВП повышает риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Jeroen CF де Йонг ¹, Пол Б. ван ден Берг, Хильде Тоби, Лолкье Т.В. де Йонг-ван ден Берг

Принадлежности

PMID: 12814454 PMID: PMC1884264 DOI: 10.1046/j.0306-5251.2002.01770.x

Бесплатная статья ЧВК

Абстрактный

Цели: Исследовать взаимосвязь между использованием антидепрессантов с НПВП или без них и риском побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Методы: Это было популяционное когортное исследование. Были изучены данные о лекарствах 180 000 пациентов из 16 аптек в Нидерландах. Субъектами была группа из 15 445 новых пользователей антидепрессантов с НПВП или без них. Был проведен обзор профилей пациентов на предмет побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванных первым приемом антидепрессантов с НПВП или без них. Количество первых назначений препаратов для лечения язвенной болезни (анатомо-терапевтическая химическая классификация A02B) в период со 2-го дня после начала приема антидепрессантов с НПВП или без них до 10-го дня после приема последней дозы было основным показателем исхода.

Полученные результаты: В контрольной группе из 619 новых пользователей неселективных антидепрессантов (ТЦА) частота первых назначений лекарств от язвенной болезни составила 0,051 (95% доверительный интервал 0,021, 0,105). Использование СИОЗС (n = 1181) вызвало несколько более высокий коэффициент заболеваемости (IRR) 1,2 (0,5, 2,8). Комбинированное применение СИОЗС и НПВП (n = 86) повышало ВСД до 12,4 (3,2, 48,0). Напротив, комбинация неселективных антидепрессантов и НПВП (n = 74) повышала ВСД до 2,5 (0,3; 20,3).

Выводы: СИОЗС увеличивают риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта у начинающих пользователей по сравнению с неселективными антидепрессантами. Совместное использование СИОЗС и НПВП значительно увеличивает риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, и его следует избегать. Комбинация неселективных антидепрессантов и НПВП не оказывает такого эффекта.

Комментарий в

Повышенный риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта при применении комбинации СИОЗС/НПВП может быть связан с фармакокинетическими взаимодействиями.

Зуллино Д.Ф., Хазаал Ю.

Бр Дж Клин Фармакол. 2005 г., январь; 59(1):118-9; ответ автора 119. doi: 10.1111/j.1365-2125.2005.2212_1.x.

PMID: 15606451 Бесплатная статья PMC. Аннотация недоступна.